

SUIVI DE POPULATION CAMPAGNOLS DES CHAMPS DU 20/05/2021

*Suivis réalisés par la méthode indiciaire à intervalles de 5 m et d'un rayon de 1.5 m sur une diagonale qui traverse la parcelle.

GRUES

Luzerne dont la végétation au stade début floraison mesure environ 60 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bandes enherbées dont la végétation mesure 15 cm.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

L'AIGUILLON SUR MER

Luzerne dont la végétation au stade début floraison mesure environ 60 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bandes enherbées dont la végétation est dense et mesure 30 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

TRIAIZE

Luzerne dont la végétation au stade début floraison mesure environ 60 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice de présence positif, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bandes enherbées dont la végétation mesure 20 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

ST MICHEL EN L'HERM

Luzerne dont la végétation mesure 40 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bandes enherbées denses avec 20 cm de hauteur.
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

PLAINE DE FONTENAY LE COMTE

La diagonale indiciaire réalisée dans une luzerne de 40 cm de hauteur avec 50 observations n'a permis de détecter aucune trace d'activité positive. Le taux indiciaire est de 0 %.

Pas de présence observée sur les bords des routes et aucun dégât n'est visible dans les cultures de blé ou de colza.

RESUME :

La population de campagnol est globalement toujours très faible et aucun indice de présence n'a été relevé sur les luzernes dont la végétation est bien développée et en début de floraison. Pas de présence observée non plus sur les bandes enherbées.

Le constat est identique autant pour le secteur du marais de la baie de L'Aiguillon que pour le secteur de la plaine de Fontenay le comte.

Aucune activité de campagnols n'est observée actuellement par les agriculteurs rencontrés.

Les prédateurs, échassiers sont totalement absents mais on peut néanmoins observer quelques rapaces diurnes sur différents secteurs, notamment sur les prises de Malakoff et du Gros Jonc à St Michel en L'Herm (busards cendrés).