

ACTUALITÉS

JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

Pyrale : premiers vols en région

EN BREF

Au jardin d'ornement

Lys, Rosier

Au potager

Chou, Concombre/
Courgette, Laitue, Oignon,
Poireau, Pomme de terre,
Radis, Tomato

Au verger

Pommier

NOTE NATIONALE

Les abeilles et insectes pollinisateurs butinent...

Protégeons-les !

Portail Ecophyto JEVI PRO
Site Jardiner Autrement

Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant [ici](#)

JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

• Pyrale : premiers vols en région

Réseau d'observations

Région de Derval, Vignoble nantais, secteur d'Angers, des Mauges, lavallois, Nord Mayenne, Pays Fléchois, Pays de Sainte Hermine et région yonnaise. Jardins d'amateurs, jardin remarquable et espaces verts.

Observations

Les pièges de deux sites présentent des captures, de l'ordre de 1 à 3 papillons, fin mai et début juin, au Sud de Nantes et en Vendée.

Analyse et gestion de risque

Actuellement, le stade en présence ne justifie aucun traitement de biocontrôle. Pour les jardiniers qui souhaiteraient lutter par des lâchers de trichogrammes (micro-hyménoptères parasitoïdes - œufs), vérifiez l'évolution des captures dans les pièges et planifiez ces interventions dès la présence de papillons.



Papillon de la Pyrale du buis capturé dans un piège à phéromone, à droite

ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le web...

- www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
- www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
- www.polleniz.fr

... ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution :

<https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/>

Méthodes alternatives



Confusion sexuelle à base de médiateur chimique : pour exprimer son plein potentiel, celle-ci a intérêt à être réalisée sur de grandes surfaces ou mieux dans le cadre d'une lutte collective à l'échelle de plusieurs jardins limitrophes ou d'une commune, car si des femelles de pyrale sont fécondées hors de la zone traitée, elles peuvent tout à fait venir pondre sur les buis dans les km environnants. A positionner avant la capture des premiers papillons.

Lâchers de trichogrammes : il s'agit d'hyménoptères parasitoïdes oophages, dont la mobilité est assez faible à partir des points de lâcher (environ 40 cm) donc plutôt adaptés à la protection des buis isolés ou topiaires, mais certains sites en espaces verts ont noté une bonne efficacité sur tous leurs buis, à condition d'apporter les quantités nécessaires et de respecter scrupuleusement les conditions d'emploi. A effectuer dès la capture des premiers papillons mâles en piège phéromonal. Source : J JULLIEN - DGAL.

Synthèse SAVE BUXUS, volet pyrale du buis. Y accéder en cliquant [ICI](#).

EN BREF

• Au jardin d'ornement

Lys

Présence criocères - sur plusieurs plantes - en baisse.
Région Erdre et Gesvres et Sud de Nantes ; jardins d'amateurs.

Rosier

Absence mildiou.
2 parcelles : présence maladie des taches noires.
2 parcelles : présence oïdium.
5 parcelles : présence pucerons.
1 parcelle : présence rouille (vieilles feuilles).
Présence coccinelles, syrphes.
Pays Nantais, Pays de Retz, région d'Angers, corniche angevine, Anjou bleu, Pays craonnais, secteur lavallois ; jardins d'amateurs.

• Au potager

Artichaut

Présence pucerons noirs.
Secteur Lac de Grand-Lieu ; potager d'amateur.

Chou

Absence piéride.
Absence altise.
Pays de Retz, Région Erdre et Gesvres, secteur de Derval, corniche angevine, Anjou bleu, secteur lavallois ; potagers d'amateur.

Concombre / courgette

Absence oïdium.
Pays de Retz, Pays de Craon ; une parcelle en jardins familiaux.

Laitue

2 parcelles : présence limaces - dégâts limités.
Région d'Angers, secteur lavallois, Pays craonnais ; un jardin partagé, une parcelle en jardins familiaux et potager d'amateur.

Oignon

Absence mildiou.
1 parcelle : présence de pupes et larves de mouche mineuse (oignons blancs).
1 parcelle : présence rouille.
Pays de Retz, Pays craonnais et secteur lavallois ; une parcelle en jardins familiaux et potagers d'amateur.

Poireau

Absence thrips / teigne.
1 parcelle : présence rouille.
Pays de Retz, Pays craonnais ; potager d'amateur et une parcelle en jardins familiaux.

Pomme de terre

Absence mildiou.

2 parcelles : présence doryphores.

1 parcelle : présence alternariose.

Pays de Retz, Région Erdre et Gesvres, Région d'Angers,
Pays craonnais, secteur lavallois ; potager d'amateur et une
parcelle en jardins familiaux.



© G WUSTER - Potageer d'amateurs

Alternariose - Pomme de terre (feuille)

Radis

Présence altises - dégâts limités.

Région d'Angers ; jardin partagé.

Rhubarbe

Présence pucerons

Région Erre et Gesvres ; potager d'amateur.

Tomate

Absence mineuse de la tomate (piège - phéromone).

Région Erdre et Gesvres et secteur de Derval ; potagers
d'amateur.

Absence mildiou / alternariose.

1 parcelle : présence pucerons (aîlés).

Région Erdre et Gesvres, secteur de Derval, corniche ange-
vine, Pays d'Ancenis, Pays craonnais, secteur lavallois ; po-
tagers d'amateur et une parcelle en jardins familiaux.



© J GOURDIEN - POLLENIZ

Pucerons - Rhubarbe

Les conditions climatiques actuelles devraient limiter le développement des maladies

• Au verger

Pommier

2 parcelles : présence carpocapse (piège - phéromone).

- 7 captures / piège / semaine ;
- 1 capture / piège / semaine.

1 parcelle : présence pucerons cendrés.

1 parcelle : présence tavelure.

Absence puceron lanigère.

Sud de Nantes, Pays de Retz, Mayenne angevine, Pays flé-chois ; vergers d'amateur.



© G WUSTER - Verger d'amateurs

Tavelure - Pommier

NOTE NATIONALE

Les abeilles et insectes pollinisateurs butinent...

• Protégeons-les !

Consultez l'intégralité de la note nationale en cliquant sur l'encadré ou le dessin.




A RETENIR

- **En période de floraison ou de production d'exsudats, il est interdit de traiter en présence d'abeilles.** Même si le produit comporte la mention « abeilles », cela ne signifie pas qu'il est inoffensif.
- **Des pollinisateurs sauvages sont présents sur des plages horaires plus larges au cours de la journée et avec des températures plus fraîches** (par ex. les bourdons). Les comportements et modes de vie de ces insectes (horaires de butinage, mode de nidification et de reproduction, préférences alimentaires, ...) sont variés et peuvent différer de ceux de l'abeille domestique. De plus, leur sensibilité aux produits phytopharmaceutiques peut être différente.

Portail ECOPHYTO JEVI PRO

Dans le cadre du plan Ecophyto en JEVI Pro, un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les **professionnels** des JEVI et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques vers une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.ecophyto-pro.fr



Site internet : Jardiner Autrement

Un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les **Jardiniers amateurs** et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.jardiner-autrement.fr/.

