

ACTUALITÉS

JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

Pyrale : vols en cours

Pin

Processionnaire : surveiller les chenilles

EN BREF

Au potager

Chou, Concombre, Poireau, Pomme de terre, Tomate

Au jardin d'ornement

Rosier

Au verger

Pommier

NOTE NATIONALE

Les abeilles et insectes pollinisateurs butinent...

Protégeons-les !

Portail Ecophyto JEVI PRO
Site Jardiner Autrement

Accéder au site de la Surveillance Biologique du Territoire en cliquant [ici](#)

JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

• Pyrale : vols en cours

Réseau d'observations

Région de Derval, Secteur Erdre et Gesvres, Sud de Nantes, secteur d'Angers, des Mauges, Lavallois, Nord Mayenne, Sud Mayenne, Haut-Anjou, Pays Fléchois, Pays de Sainte Hermine, cœur du bocage vendéen et région yonnaise. Jardins d'amateurs, jardin remarquable et espaces verts. 30 pièges.

Observations

Les vols sont en cours dans tous les départements.

Cf. graphe page suivante pour le piégeage des papillons par département.

Les captures de papillons évoluent en fonction des sites d'observations et il peut y avoir des petits décalages selon les départements. Cela montre l'intérêt d'effectuer une surveillance à la parcelle.

Analyse et gestion de risque

Suivez l'émergence des papillons, l'éclosion des pontes et la présence de jeunes chenilles.



Morsures foliaires, ci-dessus

Jeune larve - Pyrale du buis, ci-dessous



© F GASTINEL - POLLENIZ

ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le web...

- www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
- www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
- www.polleniz.fr


... ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution :
<https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/>

Prophylaxie : supprimer manuellement ou mécaniquement (appareil à air ou à eau sous pression) les chenilles en présence, dans le cas d'une faible infestation.



Micro-organismes : *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* en présence de jeunes chenilles. Soigner la qualité de la pulvérisation (traiter aussi l'intérieur des buis). Il est vivement conseillé de n'effectuer qu'un seul traitement par génération dans le but d'éviter d'éventuels phénomènes de baisse d'efficacité progressive du produit sur les populations, à la dose homologuée dans les conditions d'application indiquées.

Synthèse SAVE BUXUS II, volet pyrale du buis. Y accéder en cliquant [ICI](#).



• Processionnaire : surveiller les chenilles

Réseau d'observation

90 pièges à phéromones sont installés sur les 5 départements de la région des Pays de la Loire.

Observations

Les captures sont à la baisse dans les départements 49, 53 et 85.

Dans le département 49, un pic de captures a été observé en semaine 29 et un léger rebond en semaine 32.

Dans le département 53, un pic de capture a également été observé en semaine 29 et un petit rebond en semaine 33.

Dans le département 85, le pic de capture a été enregistré en semaine 29 et un petit rebond en semaine 33.

Dans le département 44, le pic de capture se situe en semaine 30 et un rebond a été enregistré en semaine 35.

En ce qui concerne la Sarthe, les pièges ont commencé à capturer en semaine 31 et les vols sont en augmentation depuis cette date.

Cf. graphe ci-dessous pour le piégeage des papillons par département.

Il faut continuer à suivre les prochains relevés afin d'appréhender la dynamique de vol.


Présentation, biologie, nuisances et prévention

BSV JEVI n° 7 du 11 juin 2020, p 4 [ICI](#)

Gestion du risque

Les éclosions ont lieu 35 à 40 jours après les vols. Ainsi, la majorité des éclosions sont théoriquement observables fin août, début septembre en lien avec les pics de vol des semaines 29 à 30. Des larves de stade L2 ont été observées en semaine 35 et 36 sur certains secteurs de la côte vendéenne et sur la côte de la Loire-Atlantique.

Une intervention de biocontrôle peut se programmer 35 à 40 jours après un pic de vol. Il est possible d'utiliser des produits de biocontrôle (à base de *Bacillus thuringiensis*) - [liste disponible ICI](#) - à privilégier sur les premiers stades larvaires. Lors d'une faible infestation, une taille des rameaux peut également être effectuée.



EN BREF

Au potager

Chou

Présence de piérides sur 2 sites.

Région Erdre et Gesvres, Corniche angevine, Pays Craonnais ; potagers d'amateur et une parcelle en jardins familiaux.

Concombre

Présence d'oïdium.

Pays Craonnais ; une parcelle en jardins familiaux.

Poireau

Présence de rouille sur 1 parcelle.

Absence de mineuse sur 1 parcelle.

Région Erdre et Gesvres, Pays Craonnais ; potagers d'amateur et une parcelle en jardins familiaux.

Pomme de terre

Présence de pourriture sur tubercules, provoquée par le mildiou, sur la variété 'Nicola', sur une parcelle.

Pays Craonnais ; potager d'amateur

Tomate

Présence de mildiou sur 3 parcelles.

Corniche Angevine, Pays Craonnais, Anjou bleu ; potagers d'amateur et une parcelle en jardins familiaux.



© J GOURDIEN - POLLENIZ

Chenilles de piérides du chou

Au jardin d'ornement

Rosier

Présence de la maladie des taches noires sur un site.

Corniche Angevine, Pays Craonnais, Anjou bleu ; potagers d'amateur et une parcelle en jardins familiaux.

Au verger

Pommier


Présence de carpocapse (piège - phéromone) sur 2 parcelles : 3 à 4 captures / piège / semaine.

Région Erdre et Gesvres, Pays de Retz, Pays fléchois ; vergers d'amateur.

[Dernier BSV filière arboriculture ICI.](#)

Portail ECOPHYTO JEVI PRO

Dans le cadre du plan Ecophyto en JEVI Pro, un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les **professionnels** des JEVI et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques vers une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.ecophyto-pro.fr



Site internet : Jardiner Autrement

Un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les **Jardiniers amateurs** et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.jardiner-autrement.fr/.

