

ACTUALITÉS

JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

Pyrale : diminution de l'activité

Pin

Processionnaire : surveiller les chenilles

Information

Portail Ecophyto JEVI PRO

Site Jardiner Autrement

Accéder au
site de la
Surveillance
Biologique du
Territoire en
cliquant [ici](#)

JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

• Pyrale : diminution de l'activité

Réseau d'observations

Région de Derval, Secteur Erdre et Gesvres, Sud de Nantes, secteur d'Angers, des Mauges, Lavallois, Nord Mayenne, Sud Mayenne, Haut-Anjou, Pays Fléchois, Pays de Sainte Hermine, cœur du bocage vendéen et région yonnaise. Jardins d'amateurs, jardin remarquable et espaces verts. 30 pièges.

Observations

On constate très peu de retours de données de piégeage pour cette dernière quinzaine d'octobre, fort probablement en coïncidence avec les vols des papillons qui se terminent. Toutefois, quelques vols sont encore enregistrés sur deux sites du département 44 et sur deux sites du département 49. Des captures importantes sont encore relevées dans le département 72.

A noter qu'il n'y a pas de signalement de présence larvaire quelque soit le site.

Cf. graphe page suivante pour le piégeage des papillons par département.

Analyse et gestion de risque

Les vols vont se terminer. Les chenilles qui seraient présentes vont rentrer en hibernation et passer l'hiver dans des loges d'hibernation puis se réactiver au printemps.

La suppression manuelle des différents stades du ravageur en présence (chenilles avant leur diapause et loges d'hibernation) permettra de limiter les infestations de printemps.



Loge d'hibernation, située entre 2 feuilles de buis, dans laquelle la chenille passe l'hiver

Source photo :
Ephytia

Synthèse SAVE BUXUS II, volet pyrale du buis. [Y accéder en cliquant ICI.](#)


ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le web...

- www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
- www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
- www.polleniz.fr

... ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution :

<https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/bulletins-techniques-dont-bsv/bsv-pays-de-la-loire/abonnez-vous-gratuitement-aux-bsv/>



P_{in}

• Processionnaire : surveiller les chenilles

Observations

Il n'y a pas eu de retour de piégeage depuis fin septembre, fort probablement en coïncidence avec la fin des vols des papillons. Cf. graphe page suivante pour le piégeage des papillons par département.

Présentation, biologie, nuisances et prévention

BSV JEVI n° 7 du 11 juin 2020, p 4 [ICI](#)

Gestion des chenilles en automne

Avant le démarrage des processions, poser des écopièges pour intercepter les chenilles qui descendront le long du tronc. Il existe différentes tailles d'écopièges selon la circonférence des troncs. Penser à mesurer la circonférence de vos arbres.

L'échenillage des branches portant les cocons, puis leur suppression, peut être effectué en veillant à porter une protection individuelle complète (combinaison, masque, lunettes, gants et bottes). En effet, les chenilles sont urticantes à partir du 3^{ème} stade larvaire...


Installer des nichoirs pour les oiseaux (=prédateurs). Les mésanges charbonnières sont particulièrement friandes des chenilles processionnaires du pin, surtout pendant les stades non urticants.

L'utilisation de produits de biocontrôle (à base de *Bacillus thuringiensis*) - [liste disponible ICI](#) - est à privilégier sur les premiers stades larvaires.




Écopiège fixé au tronc

Captures hebdomadaires de papillons Processionnaire du Pin - Cumuls et Moyennes départementales - Moyenne régionale



Portail ECOPHYTO JEVI PRO

Dans le cadre du plan Ecophyto en JEVI Pro, un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les **professionnels** des JEVI et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques vers une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.ecophyto-pro.fr



Site internet : Jardiner Autrement

Un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les **Jardiniers amateurs** et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.jardiner-autrement.fr/.



RÉSEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2021
PAYS DE LA LOIRE



Rédacteur : Noémie JACQUEMIN & Francine GASTINEL - Polleniz - bsv.jevi@polleniz.fr

Directeur de publication : Denis LAIZÉ - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire.

Groupe technique restreint : POLLENIZ - CRAPL - DRAAF Pays de la Loire - Jardiniers amateurs.



Observateurs : POLLENIZ, les jardins de William CHRISTIE, service Espaces verts de la ville de : CHEMILLE EN ANJOU, MAYENNE, jardiniers amateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CAPDL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles.