

Bulletin de Santé du Végétal

Financé dans le cadre
de la stratégie écophyto

GOUVERNEMENT
France
Pays de la Loire

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

BSV ORNEMENT N° 9
DU 28 SEPTEMBRE 2026

ACTUALITES

Les ravageurs :

Pucerons, thrips, acariens : à surveiller

Pépinnières : cicadelles sur différentes cultures, tigres sur *Malus* sp.

Ravageurs du réseau de piégeage :

Tordeuse européenne de l'œillet
Reprise de captures en extérieur sur un site

Duponchelia fovealis
Captures faibles

Maladies cryptogamiques

Pépinnières
Quelques cas d'oïdium

Notes Nationales

BSV-Abeilles pollinisateurs

Nouvelles notes nationales :
Pollinisateurs
Mares
Trognes

Autres notes nationales
Coléoptères
Oiseaux
Vers de terre
Abeilles sauvages
Flore des bords de champs
Insectes auxiliaires
Arbres et haies champêtres
Araignées
Chauve-souris
Papillons

Ecophytotic

Liste produits de biocontrôle

Après les chaleurs du week-end, le début de semaine s'annonce mitigé avec des précipitations possibles lundi et mercredi.

LUNDI 28	MARDI 29	MERCREDI 30	JEUDI 01	VENDREDI 02	SAMEDI 03	DIMANCHE 04
						
17° / 23°	17° / 28°	20° / 24°	15° / 23°	11° / 24°	12° / 23°	13° / 23°
▲ 10 km/h	▲ 20 km/h 40 km/h	▼ 15 km/h	► 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source : Météo France—Angers 28/09/2026 à 13h00. Retrouvez les données météo actualisées : [ici](#))

Ravageurs à surveiller

Pucerons : à surveiller

Cultures florales : recrudescence de foyers sur chrysanthèmes.

Pépinnières : peu de retours si ce n'est quelques observations de foyers en extérieur notamment sur *Photinia* sp. et sous abri sur *Coronilla* sp., *Lagerstroemia* sp., *Pittosporum* sp., *Rosa* sp., *Salix* sp..

Gestion du risque : détecter au plus tôt les foyers et suivre l'évolution des populations et des auxiliaires. A surveiller.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

- Aide à l'identification des pucerons polyphages couramment rencontrés en horticulture [ICI](#)
- Pour en savoir plus sur les pucerons et leurs ennemis naturels : [Encyclop'Aphid](#)



POLLÉNIZ
Macrosiphoniella sanborni sur chrysanthème



POLLÉNIZ
Pucerons sur *Lagerstroemia* sp.

ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le [site de la DRAAF](#), le [site de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire](#) ou sur le [site de Polléniz](#)

... ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution : <https://ecophyto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/surveillance-biologique-du-territoire/bulletin-de-sante-du-vegetal>

Avec le
soutien
financier de



Thrips

Cultures florales : peu de signalements si ce n'est quelques foyers sur chrysanthèmes et une recrudescence sur cyclamens.

Evaluation du risque : les journées ensoleillées et la floraison de certaines plantes sensibles sont favorables à leur développement. Vigilance sur les dégâts directs et indirects (transmission de virus tels que TSWV, INSV, IYSV...). A surveiller.

Pépinières : présence de thrips sur Rosa Zepeti®, *Choisya* sp., *Camellia* sp., *Rhododendron* sp..

Prophylaxie :

- Examen des végétaux entrant dans l'entreprise. Cette étape est essentielle pour contrôler l'introduction de thrips particulièrement difficiles à combattre comme les thrips 'marcheurs' (dont *Echinothrips americanus*, *Heliothrips haemorrhoidalis*).

- Observation des plantes sensibles et réalisation de frappages des feuilles et fleurs sur un papier blanc pour détecter la présence de thrips et déterminer le niveau d'infestation par comptage des individus.
- Installation de plaques engluées pour détecter leur présence au plus tôt afin de mettre en place efficacement la Protection Biologique et Intégrée (PBI). L'utilisation de kairomones peut augmenter l'attractivité des panneaux chromatiques.

Pour que la lutte biologique soit un succès, elle doit être basée sur des actions combinées et préventives, y compris les mesures prophylactiques contre les stades inertes de l'insecte - pronymph et nymphe (formes de conservation) - dans la couche superficielle du sol (dessous de tablettes, abords de serres...).

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Acariens tétranyques :

Cultures florales : cas sur poinsettia et *Viola cornuta*.

Pépinières : quelques observations sur différents végétaux d'ornement sous abri notamment sur *Choisya* sp., *Euonymus* sp., *Phormium* sp., *Tetrapanax* sp..

Evaluation du risque : les acariens tétranyques profitent des conditions chaudes et d'une hygrométrie faible pour se développer.

Dégâts : les acariens tétranyques sont des ravageurs qui se nourrissent en vidant les cellules des plantes. Ils possèdent pour cela des pièces buccales de type suceur. Les acariens colonisent généralement le revers des feuilles. Des décolorations correspondant aux plages de cellules vidées apparaissent alors sur la face supérieure des feuilles.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Symptômes d'acariens tétranyques sur *Euonymus* sp.

• Autres ravageurs

Cicadelles

Pépinières : les populations sont toujours présentes sur certains sites en extérieur et sous abri notamment sur *Chaenomeles* sp., *Deutzia* sp., *Ficus carica*, *Feijoa* sp., *Photinia* sp., *Pittosporum* sp., *Prunus* sp., ... sans dégâts majeurs observés.

Evaluation du risque : en piquant les feuilles, les cicadelles engendrent une décoloration voire une déformation du feuillage de certaines plantes et un ralentissement de la croissance des cultures sensibles.

Les conditions climatiques chaudes et ensoleillées sont favorables à leur développement. Le risque s'amplifie avec l'augmentation des températures et des ambiances plus sèches.

Piégeage : panneaux englués rouges au-dessus ou au niveau de la culture.

Biocontrôle : voir dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Panneau englué rouge pour la capture des cicadelles



En bref

Pépinières

- **Tigres sur *Malus* sp.** : le tigre du poirier (*Stephanitis pyri*) peut infester différents végétaux de la famille des Rosacées (*Crataegus* sp., *Cotoneaster* sp., *Malus* sp., *Prunus mahaleb*, *Rosa* sp.). [Info+](#)



Tigres et leurs dégâts au revers d'une feuille de *Malus* sp. (source photo Ephytia -Chamont S/ INRAE)

Ravageurs suivis par le réseau de piégeage

• Tordeuse européenne de l'œillet (*Cacoecimorpha pronubana*)

Observations : reprise de captures au cours des 15 derniers jours sur un site en extérieur dans le 72. Pas de retour de comptage sur les 5 autres sites sous tunnel dans le 49.

Evaluation du risque : surveiller l'évolution des vols et l'apparition des jeunes chenilles. Après la ponte, les œufs éclosent au bout de 2-3 semaines puis les jeunes chenilles commencent à décaper des feuilles regroupées par une toile.

Piégeage : surveiller les vols des papillons avec des pièges à phéromone spécifique.

Lutte mécanique : les opérations de taille permettent d'éliminer les chenilles positionnées sur les apex.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Tordeuse de l'œillet sur *Euonymus* sp. : a : dégâts de chenilles sur feuille ; b : adulte femelle (photo : POLLENIZ)

• *Duponchelia fovealis*

Observations : 5 pièges à phéromones ont été installés en cultures de cyclamen en région angevine. 2 papillons ont été piégés au cours des 15 derniers jours. Pas de dégât détecté. A surveiller.

Piégeage : installer des pièges lumineux UVA ou des pièges à phéromones dès le début de la culture. Il existe 3 types de pièges : piège à eau, piège delta et piège en tube, selon les conditions de culture de l'entreprise.

Prophylaxie :

- bien nettoyer les serres (vide sanitaire, élimination des vieilles plantes et des déchets végétaux...) ;
- surveiller les plantes de négoce et les jeunes plants dès leur arrivée dans l'entreprise, sources potentielles d'infestation ;
- détruire les plantes infestées et ne pas les mettre au compost (retour possible sous forme de papillon dans les serres) ;
- être vigilant aux symptômes de faiblesse (cyclamen qui ne fleurit pas, plante qui fane alors qu'elle est arrosée...).

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Source : Fiche ECOPHYTO DEPHY Gérer *Duponchelia fovealis* avec des pièges à phéromone. Y accéder [ICI](#)



POLLENIZ

Maladies cryptogamiques

Oïdium

Pépinières : quelques cas sur cultures sensibles en extérieur, notamment *Amelanchier sp.*, *Spiraea sp.*, *Hydrangea sp.* et aussi sur *Acacia sp.* sous abri.

Evaluation du risque : l'oïdium prolifère avec l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et l'humidité des espaces de culture.

Prophylaxie : parmi les mesures de préventions culturales, proscrire l'excès d'engrais azoté, le confinement de végétation et distancer suffisamment les végétaux en culture hors-sol.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Oïdium sur spirée

Note nationale BSV – Abeilles-Pollinisateurs

La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale BSV – Abeilles-Pollinisateurs : des auxiliaires à préserver](#)



Le déclin des insectes pollinisateurs est ...
... une réalité mondiale impliquant de nombreux facteurs de stress, notamment d'origine biologique, toxicologique, alimentaire et environnementale (climat, pertes d'habitats, érosion de la biodiversité florale...).

La protection des cultures et des insectes pollinisateurs

Des risques pour la santé de ces auxiliaires

Tous les produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides...), qu'ils contiennent des substances actives d'origine naturelle ou de synthèse et même ceux à base de microorganismes, quelle que soit leur catégorie (conventionnel, AB, biocontrôle), sont susceptibles de présenter une toxicité pour les insectes pollinisateurs.

Notes nationales biodiversité

Trois nouvelles notes nationales biodiversité sont disponibles !



Retrouvez toutes les notes nationales [ici](#).

Les autres notes nationales



Ecophytopic

Retrouvez l'actualité sur la protection intégrée des cultures en cliquant [ici](#)



Note de service DGAL/SDSPV/2026-515 du 26/08/2026 qui liste les produits de biocontrôle : retrouvez-la [ICI](#)

RESEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2026

Rédacteur : Noémie JACQUEMIN – Polleniz - noemie.jacquemin@polleniz.fr

Directeur de publication : Philippe DUTERTRE - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire.

Comité de relecture : AREXHOR PL, BHR, CAPDL, POLLENIZ, SRAL, RIPERT, FLEURON d'ANJOU, Hélène BRUN (conseiller indépendant).

Observateurs : horticulteurs, pépiniéristes, gestionnaires d'espaces verts, centres horticoles, techniciens, conseillers, formateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CAPDL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles.