

N°9 – 1^{er} octobre 2026

Financé par



Retrouvez gratuitement
les BSV sur le site de la
[DRAAF des Pays de la Loire](#)



Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de
[Polleniz](#)

ACTUALITES

JARDINS ORNEMENTAUX

- Buis - pyrales
- Pins - processionnaires

EN BREF

- Jardins ornementaux
 - o Fuschsias : absence d'acarien *Aculops*
 - o Rosiers : culture saine
- Potagers
 - o Aubergines et autres cultures : vigilance acariens - tétranyques tisserands
 - o Choux : piérides et altises
 - o Cucurbitacées : oïdium
 - o Haricots : faibles rendements
 - o Pommes de terre : récolte variable
 - o Tomates : punaises et *Tuta*
- Vergers
 - o Cognassiers : fruits sains
 - o Pommiers : fin de cycle - carpocapses
- Espaces divers
 - o Stress hydrique
- Réseaux d'observateurs
 - o Visite : la Ferme Sainte Marthe – les Jardins du Puygirault

A SURVEILLER

- *Aromia bungii*, le longicorne à col rouge classé Organisme de Quarantaine Prioritaire

NOTES NATIONALES Biodiversité & Santé des agro-systèmes : **nouvelles notes nationales !**

Trognes, Mares et Pollinisateurs

Retrouvez l'ensemble des bulletins parus [sur notre site](#).

REJOIGNEZ LE RESEAU D'OBSERVATEURS BSV JEVI

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs formés et accompagnés par un animateur régional, rédacteur du BSV. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le BSV donne une image précise et fiable de la santé des végétaux dans les différents espaces végétalisés (parcs et jardins publics, jardins historiques, terrains de sport, infrastructures, serres de collection, jardins privés, etc.).

Rejoignez le réseau de votre région et participez à l'enrichissement des BSV tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux !

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire



SOMMAIRE

JARDINS ORNEMENTAUX.....	3
Buis.....	3
Pyrales : fin des vols généralisée	3
Pins.....	5
Processionnaires : premiers pics de vols atteints	5
EN BREF	6
Jardins ornementaux	6
Fuchsias : absence d' <i>Aculops fuchsiae</i> - acarien	6
Rosiers : culture saine.....	7
Potagers.....	7
Aubergines et autres cultures : vigilance acariens - tétranyques tisserands	7
Choux : pontes de piérides signalées et altises en diminution	8
Cucurbitacées : présence faible d'oïdium	8
Haricots : baisse de rendements liée à la sécheresse	8
Pommes de terre : récolte très variable.....	8
Poivrons : belles récoltes	9
Tomates : quelques punaises et reprise d'activité pour <i>Tuta</i>	9
Vergers.....	9
Cognassiers : fruits sains	9
Pommiers : fin de cycle - carpocapses.....	9
Espaces divers	10
Stress hydrique.....	10
Réseaux d'observateurs	11
Journée Observateurs BSV JEVI.....	11
Visite de la Ferme Sainte Marthe et des Jardins du Puygirault.....	11
A SURVEILLER.....	12
<i>Aromia bungii</i>	
Le longicorne à col rouge classé Organisme de Quarantaine Prioritaire.....	12
NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ	13



JARDINS ORNEMENTAUX

Buis

Pyrales : fin des vols généralisée

Réseau d'observation

Secteurs d'Erdre et Gesvres et de Derval, Pays Nantais, plateau du Segréen, Haut Anjou, les Mauges, régions d'Angers, de Laval et de Mayenne, Pays Fléchois, cœur du Bocage Vendéen et région yonnaise. 19 pièges au total.

Surveillance


Les pièges installés par les observateurs du BSV JEVI afin de suivre l'évolution des vols du papillon mâle (monitoring) permettent de détecter les émergences de papillons qui n'auraient pas pu être évitées à partir des foyers larvaires et d'anticiper l'apparition de nouvelles générations.

Observations

Après un premier pic de vols fin mai, une reprise des vols a été constatée fin juillet - début août, pour atteindre un second pic, jusqu'à mi-août pour certains départements. Puis celui-ci est suivi d'une chute de captures, avec des pièges vides depuis quelques semaines déjà.

Les cumuls de captures restent peu élevés, en comparaison avec d'autres années plus marquées. Certains jardiniers ont dû traiter cette année mais les attaques restent maîtrisées.

Néanmoins, ces périodes résultent d'une synthèse régionale et des décalages s'observent localement, selon les jardins. Ainsi, un suivi rigoureux à la parcelle est nécessaire pour ce ravageur. C'est notamment le cas pour le secteur mayennais où une reprise des vols de fin de saison est constatée depuis deux semaines.



Financé par

Analyse et gestion du risque

Là où des vols sont toujours enregistrés, il convient de se tenir vigilant vis-à-vis de l'éclosion, puis l'arrivée de nouvelles larves ([cycle biologique ICI, page 4](#)).

Supprimez manuellement les premières chenilles que vous observerez. Inspectez bien l'intérieur de vos buis !

En complément de la suppression manuelle des chenilles, la taille (et l'évacuation !) des jeunes rameaux de buis a également montré de bons résultats.



Là où les chenilles sont présentes en grand nombre et avec des défoliations importantes, il est possible de traiter à l'aide de méthodes de biocontrôle. Pour cet usage, il existe des produits à base d'huile essentielle d'orange ou à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* (Btk). Les gestionnaires de JEV **professionnels** peuvent utiliser également un insecticide de biocontrôle autorisé à base de spinosad.

=> Pour tous ces produits, il convient de vérifier les conditions d'application, notamment en termes de températures (souvent < 25°C).

Une augmentation de cas de grillures foliaires est constatée suite à des traitements (produits à base d'huile essentielle d'orange), en lien avec des végétaux stressés et comportant des taux d'humidité foliaires bas (/sécheresse).

Enfin et dans tous les cas, effectuez vos traitements par temps couvert.

Liste des produits de biocontrôle, ICI

Il est important, pour obtenir une bonne efficacité du traitement, de tailler les buis très touffus avant la pulvérisation et de mouiller le feuillage jusqu'au point de ruissellement. Pour être détruites, les chenilles doivent ingérer suffisamment de produit (dose létale minimale). Il est inutile (et interdit !) de surdoser, mais il faut soigner la qualité de la pulvérisation (homogène, y compris à l'intérieur de la végétation, en utilisant une buse à turbulence et éventuellement avec un agent mouillant).

Attention au lessivage par les pluies, consultez la météo pour intervenir à bon escient. Il faut trois heures au minimum sans pluie après un traitement au Btk pour obtenir l'efficacité escomptée.

De plus, si vous utilisez une seule substance active, il est vivement conseillé de n'effectuer qu'un seul traitement par génération cela dans le but d'éviter d'éventuels phénomènes de baisse d'efficacité progressive du produit sur les populations, à la dose homologuée dans les conditions d'application indiquées. Ainsi, lors de l'observation des premières chenilles et des premiers dégâts, mieux vaut attendre 3-4 jours, afin d'agir sur la majorité des larves. Vous économiserez ainsi des traitements coûteux et, plus généralement, vous préserverez la biodiversité, car des produits comme le Btk visent les larves de tous les lépidoptères (papillons), pas seulement la chenille de la pyrale du buis...

Et toujours pour éviter l'apparition d'éventuels phénomènes de résistance des chenilles de pyrale du buis aux traitements larvicides à base de Bt, il est judicieux pour les gestionnaires de JEV pro d'alterner d'une fois sur l'autre, un produit autorisé à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *azawai* et de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*. À noter aussi, la pertinence d'alterner des produits à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* issus de souches différentes (souche ABTS-351, SA-11, SA-12).

Méthodes alternatives



Dans le cadre des travaux SaveBuxus (programme coordonné par Plante et Cité et ASTREDHOR), les éléments pour la gestion des populations de pyrale du buis qui ressortent sont :

- **Prophylaxie**

Supprimer les feuilles mortes et autres débris présents dans, sur, et autour du buis concerné.

Supprimer manuellement ou mécaniquement (appareil à air ou eau sous pression, souffleur ...) les stades du ravageur en présence dans le cas d'une faible infestation.

- **Suivi/Monitoring**

Observer minutieusement tous les nouveaux pieds achetés ou à planter.

Surveiller les buis de manière régulière et avec soin (jusqu'au cœur de la plante) à la recherche de chenilles hivernantes pour intervenir le plus tôt possible en adaptant les méthodes de protection.

Surveiller les vols des papillons avec des pièges à entonnoir associés à la phéromone spécifique de la pyrale d'avril à octobre.

- **Biocontrôle**

A la reprise d'activité des chenilles hivernantes, des produits à base de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* peuvent être positionnés pour interrompre le cycle de la pyrale.

Pour éviter l'apparition d'éventuels phénomènes de résistance des chenilles de pyrale du buis aux traitements larvicides à base de Bt, il est judicieux pour les gestionnaires de JEVI pro d'alterner d'une fois sur l'autre, un produit autorisé à base de *Bacillus thuringiensis* subsp. *azawai* et de *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*.

A noter aussi, la pertinence d'alterner des produits à base de *Bt* subsp. *kurstaki* issus de souches différentes pour les gestionnaires de JEVI pro. Stratégie valable également pour les particuliers (jardiniers amateurs) - (*Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* souche ABTS-351, *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* SA-11, *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* SA-12).

Pins

Processionnaires : premiers pics de vols atteints

Réseau d'observation

Pays nantais, Côte d'amour, Pays de Guérande, Pays de Retz, les Mauges, Anjou Bleu, Haut-Anjou (côté 49), secteur Lavallois, Nord et Sud Mayenne, Pays Fléchois, région du Lude, Côte de Lumière ; espaces verts et jardins de particuliers.

67 pièges au total.

Présentation – Biologie – Surveillance - One Health, une seule santé

Page 4 du [BSV JEVI n°4, disponible ICI](#).

Les pièges installés par les observateurs du BSV JEVI permettent de suivre l'évolution des vols du papillon mâle (monitoring) et ainsi détecter les émergences de papillons, puis anticiper les périodes des éclosions.


Depuis le [25 avril 2022](#), cette espèce est classée espèce nuisible à la santé humaine dans le code de la Santé Publique.

[Infos / One Health](#)

Observations

On observe un pic de vols autour de la semaine 28. Pour la Vendée, cette période est plus avancée et s'étend des semaines 25 à 27. Cet été, il n'y pas eu de rebond de captures, comme observé habituellement.

Autre fait notable, pour la majeure partie des départements, les cumuls de captures sont très largement supérieurs à ceux de l'année dernière.



Analyse et gestion du risque

Rappel : [BSV JEVI n°7 page 5](#).

Les pics de vols ne suffisent pas à quantifier les populations larvaires à venir. Effectivement les pontes sont sensibles à la chaleur et à l'humidité, ce ravageur n'appréciant pas des conditions climatiques trop sèches. Il convient alors de compléter ce suivi par piégeage avec des observations de pontes-éclosions, puis de chenilles. Ce sont ces dernières qui permettront d'évaluer l'importance des populations automnales et les risques sanitaires associés.

Les interventions microbiologiques à base de *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* sur les premiers stades larvaires ont démarré début septembre en Loire-Atlantique et en Vendée.



EN BREF

Jardins ornementaux

Fuchsias : absence d'*Aculops fuchsiae* - acarien

Observations

Observation intéressante à signaler pour cette année : le phytopte du fuchsia, observé depuis plusieurs années sur une parcelle au Sud de Nantes a été absent durant toute cette saison. Ce constat est également partagé au sein des connaissances de ce particulier, par d'autres jardiniers bretons.

Rosiers : culture saine

Observations

Cette année, les rosiers auront été très peu touchés par les ravageurs et n'ont présenté aucune maladie (constat général, partagé pour la plupart des végétaux en lien avec la sécheresse). Au sein du réseau d'épidémiosurveillance, les observateurs précisent que les rosiers ont particulièrement bien tenu les différents épisodes de sécheresse et ils nous font encore profiter de belles remontées de floraison en cette fin de saison.

Potagers

Aubergines et autres cultures : vigilance acariens - tétranyques tisserands

Observations

Ce ravageur, appréciant des conditions chaudes et sèches, a été observé sur de nombreuses cultures et dans plusieurs jardins cet été, dans le secteur Erdre et Gesvres, le vignoble nantais, le Baugeois, les Mauges et dans le cœur du bocage vendéen. Il est même responsable de baisses de productions, toujours constatées début septembre.

Ses populations sont constatées sur : aubergines, haricots (serre et extérieur), melons, pastèques.

Analyse et gestion du risque

Avec les pluies récentes et l'humidité associée, ces populations devraient naturellement diminuer.

Les années chaudes et sèches sont très favorables au développement des acariens phytophages (nuisibles aux cultures sensibles).

À tous les stades actifs, ce tétranyque tisse à la face inférieure des feuilles des toiles soyeuses qui retiennent l'humidité et assurent une excellente protection contre le vent, les prédateurs et les traitements.

Le développement des populations de ce ravageur est favorisé par une faible hygrométrie, il est alors possible de brumiser les plantes.

En extérieur, favorisez la venue d'auxiliaires naturels en conservant des zones refuges (bandes fleuries, prairie naturelle, installation d'abris pour chrysopes...).

Il est possible d'effectuer des lâchers d'acariens prédateurs (*Amblyseius andersoni*, *Neoseiulus californicus*).

Pour préserver les auxiliaires naturels, n'utilisez pas de traitements insecticides polyvalents.

Enfin, évitez l'excès de fertilisation azotée.



© D GUÉRIF – Jardins d'amateurs

Attaques liées à la présence d'acariens -
Melons

Choux : pontes de piérides signalées et altises en diminution

Observations

Des vols de piérides sont toujours observés. Pour le moment, pas de chenilles et les jardiniers interviennent dès les premières observations en écrasant directement les pontes.

Concernant les altises, très présentes cet été dans certains potagers, leurs attaques se sont arrêtées mi-août, ce qui a permis, depuis, une belle reprise des choux.

Analyse et gestion du risque

En pages 6 et 7 du [BSV JEVI n°6 du 2 juillet 2026](#).



© F GASTINEL – Jardins d'amateurs

Pontes de piérides du chou

Cucurbitacées : présence faible d'oïdium

Observations

Des symptômes d'oïdium sont ponctuellement observés mais le développement des symptômes est très limité, ce malgré la fin de saison. Cette année, les courgettes particulièrement, ont présenté une belle production, saine.

Analyse et gestion du risque

Avec les pluies récentes et l'humidité associée, cette maladie devrait se développer davantage. Si la croissance des pieds et les récoltes ne sont pas impactées, une suppression des organes atteints peut être envisagée.

Selon le développement de la maladie et si l'intensité des symptômes met en péril la production, il est possible d'effectuer des traitements à partir des substances de base, [fiche d'usage ICI](#) ; ou de biocontrôle à base de : *Bacillus subtilis* souche IAB/BS03, cerevisane, COS-OGA, huile essentielle d'orange, hydrogénocarbonate de potassium, soufre ([dernière liste à jour ICI](#)).

ATTENTION au risque de brûlure des tissus végétaux lorsque l'huile essentielle d'orange douce est associée avec le soufre par forte chaleur.

Respectez les conditions d'application en termes de température, pour ne pas risquer de brûler le feuillage de vos plants (ex : inférieur à 28°C pour le soufre).

Haricots : baisse de rendements liée à la sécheresse

Observations

En dehors des problématiques liées aux tétraniques, un jardinier - marais breton - précise que sans attaque de ces ravageurs, lui observe néanmoins et en lien avec la sécheresse, une diminution par trois de ses quantités récoltées par rapport à l'année dernière (5 kg vs 15 kg). Un second - Est du Segréen - a observé des punaises, la deuxième quinzaine d'août.

Pommes de terre : récolte très variable

Observations

De manière très localisée, des dégâts à la récolte liés à la présence de galeries de taupins ont été observées dans le sud Mayenne.

Ailleurs, la production est qualifiée de saine et belle mais les rendements sont très moyens à bons, selon les variétés (respectivement 'Charlotte' et 'Cheyenne'), voire inexistantes pour d'autres.

Analyse et gestion du risque

En page 7 du [BSV JEVI n°2 du 30 avril 2026](#), pour la saison prochaine, maintenant.

Poivrons : belles récoltes

Observations

L'année 2026 se présente comme étant une année particulièrement favorable à la culture de poivrons, qui a dépassé tous les rendements jusqu'à présent observés par les jardiniers amateurs du réseau.

Tomates : quelques punaises et reprise d'activité pour *Tuta*

Observations

Les punaises et dégâts associés sur cette culture sont en diminution pour ce mois de septembre.

Des noctuelles ont ponctuellement été signalées mi-août, sans dégât (ou anecdotiques).

Côté maladies et conformément avec les autres cultures, très peu de développement observé sur cette culture : seulement quelques taches d'alternariose dans un potager fin août (averses à cette période) et pas de mildiou.

Concernant *Tuta absoluta*, après une période très calme, les pièges « historiques » ont capturé beaucoup de papillons, entre fin août et jusqu'à maintenant. Ces attaques de fin de saison ne portent pas préjudice aux pieds impactés. En complément du piégeage, des galeries sont également observées sur feuilles.

Pour finir, les récoltes sont variables, certains jardiniers confirment de très belles récoltes : belles tomates, en grande quantité. D'autres ont récolté peu de fruits et petits, tout au long de l'été.

Analyse et gestion du risque

Punaises : en page 6 du [BSV JEVI n°6 du 2 juillet 2026](#)

Tuta absoluta : en page 7 du [BSV JEVI n°6 du 2 juillet 2026](#)

Mildiou – Alternariose : avec les pluies récentes et l'humidité associée, soyez vigilants au développement de ces maladies.

Vergers

Cognassiers : fruits sains

Observations

Les fruits, habituellement touchés par la moniliose, sont très sains cette année.

Pommiers : fin de cycle - carpocapses

Observations

Au sein du réseau BSV JEVI, des papillons de carpocapses ont été piégés dans le secteur Erdre et Gesvres et dans le cœur du bocage vendéen mi-août et début septembre. Partout ailleurs et depuis, il n'y a plus de capture. Des dégâts sont observés dans les fruits.

Analyse et gestion du risque

La troisième et dernière génération se termine : [BSV Arboriculture professionnelle n°20](#).

Espaces divers

Stress hydrique

Observations

En complément des végétaux déjà signalés dans les derniers BSV JEVI comme étant impactés par le dérèglement climatique – sécheresses, canicules répétées - s'ajoutent aux observations de ce numéro : châtaigniers, bouleaux, thuyas, hortensias, eleagnus, lauriers palme (Nord-Ouest Vendée).



RESEAUX D'OBSERVATEURS

Journée Observateurs BSV JEVI

Visite de la Ferme Sainte Marthe et des Jardins du Puygirault

Observations

La matinée du 22 septembre a été consacrée à la visite de la Ferme Sainte Marthe, spécialisée dans la production artisanale de semences biologiques. Pour les jardiniers amateurs, ce temps de visite et d'échanges représentait un bon moyen de se rendre compte du parcours et des exigences attendues, en amont de nos cultures.



Visite de la ferme Sainte Marthe - lavage
des graines - séchage



© F GASTINEL - Polleniz



© F GASTINEL - Polleniz

L'après-midi était consacrée aux Jardins du Puygirault - jardin 0 phyto - retraçant l'histoire des potagers, de la cueillette de la Préhistoire au Jardin intérieur en passant par le Jardin du contentement, en 14 tableaux et mises en scène, dotés d'un réseau hydraulique unique. Les jardiniers du réseau ont également pu échanger entre eux sur leurs réussites, mais aussi les échecs, rencontrés au jardin. Convivialité et bonne-humeur étaient au rendez-vous !



© F GASTINEL - Polleniz



© F GASTINEL - Polleniz



© F GASTINEL - Polleniz

Financé par



A SURVEILLER

Aromia bungii

Le longicorne à col rouge classé Organisme de Quarantaine Prioritaire

Ce coléoptère originaire du Nord-Est du continent asiatique (Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Mongolie, Vietnam), appartenant à la famille des *Cerambycidae* - Capricornes, est un Organisme de Quarantaine Prioritaire - OQP.

Rappel - classement des ONR

Informations dans le BSV JEVI n°1, page 14, [en cliquant ICI](#).

Description

L'adulte, mesurant 3 à 4 cm, est de couleur noire avec la partie à l'avant du thorax (prothorax) rouge vif. Les antennes noires sont aussi longues que le corps, voire plus longues chez les males.

La larve de couleur blanc-crème est apode (sans patte) et mesure jusqu'à 5 cm. Elle dispose d'une tache frontale rousse et de mandibules noires.

Pour fiabiliser l'identification, un diagnostic en laboratoire est indispensable.



Larve - *Aromia bungii*



Adultes - *Aromia bungii*



Galleries larvaires - *Aromia bungii*

Financé par

Biologie

Le cycle biologique de cette espèce est peu renseigné.

Il se déroule sur 2 à 4 ans, selon la latitude et le climat. Les adultes volent de mars à août, période marquée par un pic entre mi-mai et mi-juillet. Leur durée de vie s'étend sur 2 à 3 semaines. La femelle pond entre 100 et 700 œufs, déposés dans les anfractuosités de l'écorce. Une fois que l'éclosion a lieu, la larve pénètre l'écorce et fore des galeries pouvant atteindre 60 cm de long, dans le tronc et les branches latérales. Elle se nourrit pendant deux à trois ans sous l'écorce jusqu'à l'aubier pour les jeunes larves. Les derniers stades larvaires peuvent attaquer jusqu'au bois de cœur où elle se transforme en nymphe. Les adultes quittent ensuite l'arbre par une galerie de section plutôt ovale bien visible (jusqu'à 16mm) mais qui peut être confondues avec d'autres xylophages.

Propagation

La distance exacte du vol n'est pas connue. Comme les capricornes asiatiques ([Bulletin JEVI n°3, page 6-7](#)), les adultes sont capables de voler de proche en proche. Sur de longues distances, le commerce de plants, de bois, et les matériaux d'emballage de *Prunus* infestés participent à sa dissémination.

Plantes hôtes

Prunus spp. dont :

Abricotier (*Prunus agmydalus*)

Pêcher (*Prunus persica*)

Prunier (*Prunus domestica*)

Merisier (*Prunus avium*)

Distribution

En Europe, ce ravageur a été découvert :

- en Allemagne, où depuis 2011, quelques détections sont signalées en cours d'éradication, la dernière datant 2024.
 - en Italie, en 2012 dans la région de Naples, en 2013 en Lombardie et plus récemment dans la région de Latium à partir de 2020, puis en Toscane et en Campanie (2023).
- À ce jour, il n'a toujours pas été détecté en France.



Dégâts causés par *Aromia bungii* - Prunier



Larve sous l'écorce - *Aromia bungii*

Impacts

La présence des larves peut induire une réduction de la fructification et de la croissance de la plante hôte, ainsi qu'un affaiblissement généralisé de celle-ci pouvant aller jusqu'à son dépérissement. Les trous de sorties, les déjections et la sciure de forage rougeâtre sont les signes de la présence de l'insecte mais ne sont pas caractéristiques de l'espèce.



Sciure de forage rougeâtre au pied d'un arbre colonisé par
Aromia bungii

En cas de suspicion de détection, alerter sans délai Polleniz ou la DRAAF-SRAL PDL qui procéderont aux vérifications nécessaires à leur identification.

Pour aller plus loin

[Plateforme ESV](#)

[Fiche de reconnaissance SORE](#)

[Note nationale BSV](#)




NOTES NATIONALES BIODIVERSITÉ



Financé par

Portail ECOPHYTO JEVI PRO

Dans le cadre du plan Ecophyto en JEVI Pro, un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les professionnels des JEVI et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques vers une réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.ecophyto-pro.fr



Site internet : Jardiner Autrement

Un site internet réunit les références et connaissances disponibles pour sensibiliser les Jardiniers amateurs et leur permettre de faire évoluer leurs pratiques. Vous pouvez accéder à ce site via le lien suivant www.jardiner-autrement.fr/.



Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières, réalisées par un réseau d'épidémiologie en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. Polleniz dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces vert, jardiniers amateurs ou détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Groupe technique restreint : DRAAF Pays de la Loire – Polleniz – Animatrice inter-filières – Jardiniers amateurs

Observations : Polleniz, jardins d'amateurs, services espaces verts de collectivités (Chemillé en Anjou, Laval, Mayenne, Sainte Hilaire de Riez), ONF.

Animation : Polleniz

Coordination, renseignements et rédaction : Francine Gastinel – bsv.jevi@polleniz.fr

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV JEVI n°9 du 1^{er} octobre 2026 »

Financé par



Bulletin de Santé du Végétal Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures – Région Pays de la Loire
BSV n°9 du 1^{er} octobre 2026