

Bulletin de Santé du Végétal

Financé dans le cadre
de la stratégie écophyto

GOUVERNEMENT
France
Pays de la Loire

**La stratégie
écophyto 2030**
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**BSV ORNEMENT N° 10
DU 09 OCTOBRE 2026**

ACTUALITES

Les ravageurs :

Pucerons, thrips, acariens : à surveiller

Pépinières : cécidomyie sur agapanthe, cicadelles sur différentes cultures, mineuses des feuilles d'agrumes, cochenilles farineuses, australiennes et diaspiques.

Cultures florales : altises sur Fuchsia, chenilles phytophages.

Ravageurs du réseau de piégeage :

Tordeuse européenne de l'œillet
Baisse des captures

Duponchelia fovealis
Captures en hausse

Maladies cryptogamiques

Cultures florales et Pépinières
Quelques cas d'oïdium

Notes Nationales

Nouvelles notes nationales :
Pollinisateurs
Mares
Trognes

Autres notes nationales
Coléoptères
Oiseaux
Vers de terre
Abeilles sauvages
Flore des bords de champs
Insectes auxiliaires
Arbres et haies champêtres
Araignées
Chauve-souris
Papillons

Ecophytotic

Liste produits de biocontrôle

La météo des prochains jours s'annonce variable avec une alternance d'éclaircies et d'un temps plus ou moins nuageux. Des précipitations sont possibles certains jours. La baisse des températures est notable.



(Source : Météo France—Angers 09/10/2026 à 10h00. Retrouvez les données météo actualisées : [ici](#))

Ravageurs à surveiller

Pucerons : à surveiller

Cultures florales : des foyers sont observés par endroit sur chrysanthèmes. La présence de coccinelle est également relevée sur certains sites.

Pépinières : retour de quelques foyers. Observations en extérieur et sous abri notamment sur *Euonymus europaeus*, *Lagerstroemia* sp., *Malus* sp., *Mespilus* sp., *Pittosporum* sp., *Viburnum* sp....

Du côté des auxiliaires : observations principalement de coccinelles et de syrphes en pépinière extérieure.

Gestion du risque : détecter au plus tôt les foyers et suivre l'évolution des populations et des auxiliaires. A surveiller.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

- Aide à l'identification des pucerons polyphages couramment rencontrés en horticulture [ICI](#)

- Pour en savoir plus sur les pucerons et leurs ennemis naturels : [Encyclop'Aphid](#)



***Macrosiphoniella sanborni* sur chrysanthème**



***Pucerons* sur *Lagerstroemia* sp.**

ABONNEMENT BSV

Retrouvez le bulletin de santé du végétal sur le [site de la DRAAF](#), le [site de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire](#) ou sur le [site de Polleniz](#)

... ou inscrivez-vous en ligne pour être informé directement par mail de chaque nouvelle parution : <https://ecophyto-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/surveillance-biologique-du-territoire/bulletin-de-sante-du-vegetal>

Avec le
soutien
financier de



Thrips

Cultures florales : un peu de thrips sur chrysanthèmes sur certains sites et présence également sur aromatiques.

Evaluation du risque : les journées ensoleillées et la floraison de certaines plantes sensibles sont favorables à leur développement. Vigilance sur les dégâts directs et indirects (transmission de virus tels que TSWV, INSV, IYSV...). A surveiller.

Pépinnières : présence de thrips sur *Rosa Zepeti*®, *Rhododendron sp.*, *Acer palmatum*, *Fatsia sp.*, *Griselinia sp.*

Prophylaxie :

- Examen des végétaux entrant dans l'entreprise. Cette étape est essentielle pour contrôler l'introduction de thrips particulièrement difficiles à combattre comme les thrips 'marcheurs' (dont *Echinothrips americanus*, *Heliethrips haemorrhoidalis*).

- Observation des plantes sensibles et réalisation de frappages des feuilles et fleurs sur un papier blanc pour détecter la présence de thrips et déterminer le niveau d'infestation par comptage des individus.
- Installation de plaques engluées pour détecter leur présence au plus tôt afin de mettre en place efficacement la Protection Biologique et Intégrée (PBI). L'utilisation de kairomones peut augmenter l'attractivité des panneaux chromatiques.

Pour que la lutte biologique soit un succès, elle doit être basée sur des actions combinées et préventives, y compris les mesures prophylactiques contre les stades inertes de l'insecte - pronymph et nymphe (formes de conservation) - dans la couche superficielle du sol (dessous de tablettes, abords de serres...).

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Acariens tétranyques :

Cultures florales : cas sur chrysanthèmes grosses fleurs, *Salvia microphylla* et *Viola sp.*

Pépinnières : persistance de foyers sur certains sites. Signalements sur *Rosa sp.*, *Hydrangea sp.*, *Pittosporum sp.*, *Fargesia sp.*

Evaluation du risque : les conditions météo plus fraîches et humides sont moins favorables. En effet, les acariens tétranyques profitent des conditions chaudes et d'une hygrométrie faible pour se développer.

Dégâts : les acariens tétranyques sont des ravageurs qui se nourrissent en vidant les cellules des plantes. Ils possèdent pour cela des pièces buccales de type suceur. Les acariens colonisent généralement le revers des feuilles. Des décolorations correspondant aux plages de cellules vidées apparaissent alors sur la face supérieure des feuilles.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



Symptômes d'acariens tétranyques sur *Euonymus sp.*

• Autres ravageurs

Cicadelles

Pépinnières : les populations sont observées sur différentes cultures, sans dégâts majeurs signalés. Elles sont relevées notamment sur *Acer sp.*, *Myrtus sp.*, *Prunus laurocerasus*, *Euonymus sp.*, *Photinia sp.*, *Pittosporum sp.*, *Prunus sp.*, *Rhamnus sp.*... Des cicadelles vertes (larves et adultes) sont présentes sur *Prunus laurocerasus* et *Euonymus europaeus* en extérieur sans dégâts notables.

Evaluation du risque : en piquant les feuilles, les cicadelles engendrent une décoloration voire une déformation du feuillage de certaines plantes et un ralentissement de la croissance des cultures sensibles. Les conditions climatiques chaudes et ensoleillées sont favorables à leur développement. Le risque s'amplifie avec l'augmentation des températures et des ambiances plus sèches. A surveiller pour anticiper la pression éventuelle au printemps prochain.

Piégeage : panneaux englués rouges au-dessus ou au niveau de la culture.

Biocontrôle : voir dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).




Panneau englué rouge pour la capture des cicadelles

Cécidomyie sur Agapanthe

La cécidomyie de l'Agapanthe (*Enigmadiplosis agapanthi*) est un diptère originaire d'Afrique du Sud. Elle est présente en Bretagne depuis 2019 et sévit dans les jardins bretons (Cf. BSV Bretagne JEVI du 09/07/2024) [ICI](#).

Les larves de la cécidomyie de l'Agapanthe se développent dans les boutons floraux ce qui induit une décoloration et une déformation des boutons, altérant parfois la floraison.

Cf. fiche de reconnaissance de l'ANSES [ICI](#)



Boutons floraux avec symptômes

En bref

Pépinières

- **Mineuses des feuilles d'agrumes** : des dégâts de mineuses *Phyllocnistis citrella* sont observés sur *Citrus* sp. en production. Les chenilles de ce lépidoptère se nourrissent des feuilles d'agrumes en creusant des galeries sous l'épiderme, engendrant un aspect argenté des feuilles. La fabrication du cocon nymphal se fait en bordure de feuille ce qui leur donne un aspect enroulé et desséché. L'élimination des jeunes pousses atteintes permet une régulation des premières générations de chenilles.
- **Cochenilles** : **cochenilles farineuses** relevées sur différents végétaux (*Agapanthus* sp., *Aralia* sp., *Choisya* sp., *Euonymus* sp., *Fargesia* sp., *Viburnum* sp., *Pittosporum* sp. et *Trachelospermum* sp., ...) et **cochenilles australiennes** sur *Pittosporum* sp., *Choisya* sp. et *Prunus* sp.. [Info +](#) . Signalements de **cochenilles diaspinées** sur *Griselinia* sp. A surveiller.



Mines sur feuilles d'agrumes

Cultures florales

- **Altises sur *Fuchsia* sp.** : les altises perforent et décapent les feuilles. Les fortes infestations peuvent conduire à une défoliation. La baisse des températures est moins favorable à leur développement. Cf. BSV 2 du 20/05/2026 page 3 [ICI](#)
- **Chenilles phytophages** : observations sur primevère, *Coleus canina* et verveine citron. Le risque est à évaluer en fonction de la biologie des espèces des chenilles présentes. A surveiller.

Ravageurs suivis par le réseau de piégeage

• Tordeuse européenne de l'œillet (*Cacoecimorpha pronubana*)


Observations : les vols sont en cours depuis 4 semaines sur 3 sites sous tunnel dans le 49 (tendance des captures à la baisse). Capture faible également (1papillon) dans le piège situé en extérieur dans le 72.

Evaluation du risque : surveiller l'évolution des vols et l'apparition des jeunes chenilles. Après la ponte, les œufs éclosent au bout de 2-3 semaines puis les jeunes chenilles commencent à décaper des feuilles regroupées par une toile.


Piégeage : surveiller les vols des papillons avec des pièges à phéromone spécifique.

Lutte mécanique : les opérations de taille permettent d'éliminer les chenilles positionnées sur les apex.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



a/



b/

Tordeuse de l'œillet sur *Euonymus* sp. : a : dégâts de chenilles sur feuille ; b : adulte femelle (photo : POLLENIZ)

• *Duponchelia fovealis*

Observations : 5 pièges à phéromones ont été installés en cultures de cyclamen en région angevine. 6 papillons ont été piégés au cours des 15 derniers jours en région angevine (captures en hausse). Pas de dégât détecté. A surveiller.

Piégeage : installer des pièges lumineux UVA ou des pièges à phéromones dès le début de la culture. Il existe 3 types de pièges : piège à eau, piège delta et piège en tube, selon les conditions de culture de l'entreprise.

Prophylaxie :

- bien nettoyer les serres (vide sanitaire, élimination des vieilles plantes et des déchets végétaux...) ;
- surveiller les plantes de négoce et les jeunes plants dès leur arrivée dans l'entreprise, sources potentielles d'infestation ;
- détruire les plantes infestées et ne pas les mettre au compost (retour possible sous forme de papillon dans les serres) ;

- être vigilant aux symptômes de faiblesse (cyclamen qui ne fleurit pas, plante qui fane alors qu'elle est arrosée...).

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).

Source : Fiche ECOPHYTO DEPHY Gérer *Duponchelia fovealis* avec des pièges à phéromone. Y accéder [ICI](#)



Papillons de *Duponchelia* sp. sur une plaque engluée d'un piège à phéromones

Maladies cryptogamiques

Oïdium

Pépinières : quelques cas sur cultures sensibles en extérieur, notamment sur *Quercus* sp., *Acer campestre*, *Rosa canina*, *Malus* sp.. A noter une apparition sur *Spiraea* sp. en extérieur.

Evaluation du risque : l'oïdium prolifère avec l'amplitude thermique entre le jour et la nuit et l'humidité des espaces de culture.

Prophylaxie : parmi les mesures de préventions culturales, proscrire l'excès d'engrais azoté, le confinement de végétation et distancer suffisamment les végétaux en culture hors-sol.

Biocontrôle : voir la dernière liste des produits de biocontrôle (lien en fin de BSV).



***Oïdium* sur spirée**

Notes nationales biodiversité



Ecophytopic

Retrouvez l'actualité sur la protection intégrée des cultures en cliquant [ici](#)



Note de service DGAL/SDSPV/2026-515 du 26/08/2026 qui liste les produits de biocontrôle : retrouvez-la [ici](#)

RESEAU DE SURVEILLANCE BIOLOGIQUE DU TERRITOIRE 2026

Rédacteur : Noémie JACQUEMIN – Polleniz - noemie.jacquemin@polleniz.fr

Directeur de publication : Philippe DUTERTRE - président du Comité régional de surveillance biologique du territoire.

Comité de relecture : AREXHOR PL, BHR, CAPDL, POLLENIZ, SRAL, RIPERT, FLEURON d'ANJOU, Hélène BRUN (conseiller indépendant).

Observateurs : horticulteurs, pépiniéristes, gestionnaires d'espaces verts, centres horticoles, techniciens, conseillers, formateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La CAPDL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées sur leurs parcelles.